Unterseite: Die Schwarzfleckung erscheint reduziert, wodurch die weißen Makel an Platz gewinnen und die gelbliche Färbung der Hinterflügel wird bleicher.

Patria: Espiritu-Santo (Jul. Michaelis leg.).

Eine bisher unbeachtete Lokalrasse einer Nymphalide aus Ost-Java

von **H. Fruhstorfer.**

Symbrenthia hypselis redesilla nov. subspec.

Sym. hypselis de Nicéville. J. B. Nat. Hist. Soc. 1891 p. 356 A. F. f. 8 ♂. Unterseite.

Fruhstorfer B. E. Z. 1896 p. 301. partim.

Die wohlbekannte *hypselis* Godt. erscheint auf Java in zwei Lokalformen — jener des Westens — wie sie Boisduval abbildet und die Rasse des Ostens, die durch de Nicéville recht gut dargestellt wurde.

Redesilla differiert von *hypselis* in der Ausdehnung aller schwarzen Binden der Flügeloberseite — die eine Reduction der rotbraunen Flecken im Gefolge hat.

Unterseits hinwiederum dominieren die rotbraunen gewürfelten Makeln.

Patria: Ost-Java 16 ♂♂, 4 ♀♀. Vulkan Aynna und Tengger. Fruhstorfer leg.

Redesilla bewohnt Höhen von 1500 bis ca. 4500 Fuß, setzt sich gerne an nasse Stellen und ist einer der ersten Falter, die nach dem Regen die Landschaft beleben. Finden sie keine geeigneten Plätze um zu saugen, setzen sie sich mit offenen Flügeln auf niedere Büsche. Trotz ihrer zarten Flügel bewegen sie sich schnell und im Zickzack vorwärts — aber niemals auf größere Entfernungen.

Von verwandten Rassen sind bekannt:

hypselis hypselis Godart. 1823.

Vanessa hyp. God. Enc. Meth. p. 818; *Laogona hypselis* Boisd. Spec. Gen. t. 10 f. 3. ♂. 1836.

West-Java — häufig. 2000—4000 Fuß. auf feuchten Waldwegen.

hypselis sinis de Nicéville. 1891.

Symbr. sinis de Nicév. l. c. p. 357/358. A. F. f. 9. ♂. partim.

Symbr. cotanda Martin und de Nicéville l. c. 1895 p. 428.

Malay. Halbinsel. Sumatra.

hypselis balunda Stdgr. 1896.

Symbr. hypselis var. *balunda* Stdgr. Iris p. 233.

Shelford. R. A. Soc. 1906. p. 126.

Patria: Nord-Borneo.

hypselis nov. subspec. Palawan.

(*Symb. niphenda* Stdgr. Iris 1887 p. 50.)

hypselis ottilia Fruhst. 1897. Nias.

(B. E. Z. 1897 p. 327; Moore Lep. Ind. IV. p. 123. 1899.)

hypselis sinica Moore 1899. West-China.

(*S. sinica* Moore l. c. p. 123.)

hypselis cotanda Moore 1874. Sikkim bis Birma.

(*S. cot.* Moore l. c. p. 114 t. 322; Bingham Fauned Indica 1905 p. 378. *S. hyp. assana* Fruhst. B. E. Z. 1899 p. 21.)